

Nova

3.11



Presentation av aktiviteter

I Novas **patientvy** visas nu bara aktiviteter som tillhör klinikens enheter.

I **avdelningsvyn** visas däremot som vanligt patientens alla aktiviteter, oavsett vilken klinik de tillhör.

Rekommendationen är att **patientvyn** öppnas för att ta del av patientens planerade aktiviteter då även fritextaktiviteterna syns i denna vy.

Nya kliniska parametrar/arketyper

- Längd
- Smärta Vila/rörelse
- Andningsfrekvens

Beställning och svar – ovidimerade svar

- Om man vidimerar det senaste svaret av flera så blir de historiska svaren också vidimerade.
- Om man vidimerar ett historiskt svar så blir endast det svaret vidimerat.

Radiologi

- Radiologiaktivitet i status skickad kan nu markeras som utförd i Nova

Upprepning på aktivitet

- Nu syns det hur en aktivitet är upprepad i aktivitetens detaljer.

Läkemedel

- Nu har interaktionsvarningar för läkemedel fått en länk till Janusmeds hemsida, där ytterligare information om interaktioner nås.

Länken syns i sidopanelen som öppnas när man trycker på ett läkemedelsnamn i vyerna Läkemedelslista och Utdelningsvy.


The screenshot shows a medical system interface for a patient named Agnes Söderlind, 51 years old, male. The patient's current medications are listed in a table:

Aktuella (4/4)	
Atorvastatin Actavis 10 mg Filmdragerad tablett, peroralt	2 tabletter
Buronil 25 mg Tablett, peroralt	2 tabletter
Treo comp Brustablett, peroralt	1 Brustablett
Warfarin Orion 2,5 mg Tablett, peroralt	2 tabletter

The detailed view for Buronil 25 mg shows the following information:

- Ordnationsinformation:**
 - Ordnationens start: 2023-08-23 14:00
 - Ordnationens slut: 2023-08-27 08:00
 - Ordinator: drxyz Maanildi, Markus
 - Ansvarig enhet: The Surgery department*
 - Administreras på enhet: Vilken som helst
- Aktuella varningar (1):**
 - [Läs rekommendationer för alla ordinerade läkemedel \(Janusmed\)](#)
 - Interaktionsvarning mellan:
 - Treo comp, Brustablett, Buronil, Tablett, 25 mg
 - Medicinsk konsekvens:** Melperon minskar den analgetiska och hostdämpande effekten av kodein.
 - Rekommendation:** Använd ett analgetikum som ej metaboliseras av CYP2D6 (t.ex. buprenorfin) eller använd ett neuroleptikum som ej hämmar CYP2D6 (t.ex. kvetiapin, olanzapin eller rispendon).

Läkemedel - biverkningsikonen



- När man trycker på interaktionsikonen under läkemedlet visas informationen också under strukturen Medicinsk konsekvens och Rekommendation.

Buronil 25 mg 2 tabletter 4 gång

Tablett, peroralt

Interaktionsvarning mellan Buronil

Treo comp 4 gång


Medicinsk konsekvens
Melperon minskar den analgetiska och hostdämpande effekten av kodein.

Rekommendation
Använd ett analgetikum som ej metaboliseras av CYP2D6 (t.ex. buprenorfin) eller använd ett neuroleptikum som ej hämmar CYP2D6 (t.ex. kvetiapin, olanzapin eller risperidon).

Klassifikation **D3**

gång

Läkemedel - biverkningsikonen



- Genom att trycka på interaktionsikonen till höger visas en beskrivning av nivåer och klassificering för interaktionsvarningar.

Meny Agnes Söderlind 19 51 år

Läkemedel Aktuella (4/4)

Läkemedelslista

Utdelningsvy

Ordningställ & överlämna

Atorvastatin Actavis 10 mg 2 tabletter 1 gång per dag tills vidare
Filmdragerad tablett, peroralt

Buronil 25 mg 2 tabletter 4 gånger dagligen i 4 dygn
Tablett, peroralt

Maxvy (3)

Beskrivning av nivåer och klassificering för interaktionsvarningar

Nivåer	Klinisk betydelse
A	Interaktionen saknar klinisk betydelse.
B	Interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar.
C	Klinisk betydelsefull som kan hanteras med t.ex. dosjustering.
D	Klinisk betydelsefull interaktion som bör undvikas.

Nivåer	Dokumentationens art
0	Data från studier av andra läkemedel med liknande egenskaper.
1	Data från ofullständiga fallrapporter och/eller in vitro-studier.
2	Data från väldokumenterade fallrapporter.
3	Data från studier på friska försökspersoner och/eller pilotstudier på patienter.
4	Data från kontrollerade studier på relevant patientpopulation.