

Mässling, rutin för inventering av exponerade vid vårdenheten

Dokumentera vilka personer som kan ha exponerats för smitta

1. Mellan vilka klockslag har patienten med mässling vistats i lokalerna?
2. Vilka personer var *samtidigt eller upp till två timmar efter detta* i lokalerna?
 - patienter
 - anhöriga till patienter som var med på mottagningen
 - personal
 - övriga (servicepersonal, tolkar, ambulanspersonal etc)
3. Lista samtliga exponerade personer, se "[Mässling, smittspårningslista för exponerade kontakter](#)"
4. Bedöm personernas immunitet enligt A–E:

A	B	C	D	E
Ovaccinerad och ej haft mässling	Osäker	Vaccinerad med 1 dos	Vaccinerad med 2 doser = immunitet	Haft mässling = naturlig immunitet*

Handläggning avseende grupp A och B bör ske skyndsamt så att eventuellt smittade personer kan erbjudas vaccin (*inom 72 timmar*) eller gammaglobulin (*till och med sex dygn efter exposition*). Detta sker i samråd med enheten för smittskydd och vårdhygien samt infektionskliniken respektive för barn med barn- och ungdomskliniken.

Personer i grupp C ska erbjudas en andra vaccindos (*ingen tidsgräns men snarast möjligt*). Gäller inte barn yngre än 6 år som fått en dos vid 18 månaders ålder.

Enhetens arbetsgivare ansvarar för att åtgärder vidtas för personal som hamnar i grupp A, B eller C (*ställningstagande till avstängning, provtagning och/eller vaccination*).

*OBS! Personer födda före 1960 räknas som naturligt immuna efter genomgången infektion.