

Samvaccination – kombinera olika vaccin

Huvudregeln är att alla typer av inaktiverade vacciner kan ges i kombination med andra inaktiverade och levande försvagade vacciner samtidigt. Detta gäller även per orala levande försvagade vacciner. Det finns ett värde i att se till att patienten erhåller nödvändiga vaccin vid besöket, då det alltid finns en risk att de inte kommer tillbaka för den andra sprutan.

Individuell bedömning vid kombination av vaccin

Samtidig administration av flera vaccin kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. De individuella konsekvenserna av ev. ökade biverkningar för den vaccinerade behöver beaktas när två eller fler vaccin ges samtidigt. Det är särskilt viktigt vid vaccination av äldre, medicinskt sköra personer och vid vaccination av gravida.

Barn rekommenderas generellt alltid minst 7 dagars intervall mellan covid-vaccination och annan vaccination, behandlande läkare avgör om undantag är motiverat.

Vid tveksamheter om sjukdomskaraktär och lämpligheten att vaccinera ska patientansvarig eller annan sakkunnig läkare rådfrågas.

- Det förstärkta influensavaccinet kan ges samtidigt som konjugerat pneumokockvaccin. För att minska risken för biverkningar kan de istället ges med en veckas mellanrum. Risk finns dock att vaccinationen inte blir av överhuvudtaget om man sprider ut doserna då invånaren inte återkommer.
- Om ett levande vaccin ges ska man vänta 4 veckor innan ett annat levande vaccin ges ex. gula febern, vattkoppsvaccin mfl

	Vaxigrip Tetra	Efluelda	Fluenz Tetra	Pneumovax (PPV23)	Prevenar 13	Prevenar 20	Comirnaty JN.1	TBE	Hepatit	Shingrix	HPV-vaccin
Vaxigrip Tetra	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Efluelda	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Fluenz Tetra	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Pneumovax (PPV23)	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
Prevenar 13	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
Prevenar 20	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
Comirnaty JN.1	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Green	Green	Green	Green
TBE	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Green	Green	Green
Hepatit	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Green	Green
Shingrix	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Green
HPV-vaccin	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red

- Kombination av vaccin vid samma tillfälle: Grönt = OK, Rött = Nej
- Ges fler vaccin går det bra att ge flera sprutor i samma arm, men om det är bara två vaccin ges de i två olika extremiteter. Om man ger i samma arm ska man separera sticken med 3 cm.