

Samvaccination – kombinera olika vaccin

Huvudregeln är att alla typer av inaktiverade vacciner kan ges i kombination med andra inaktiverade och levande försvagade vacciner samtidigt. Detta gäller även per orala levande försvagade vacciner. Det finns ett värde i att se till att patienten erhåller nödvändiga vaccin vid besöket, då det alltid finns en risk att de inte kommer tillbaka för den andra sprutan.

Individuell bedömning vid kombination av vaccin

Samtidig administration av flera vaccin kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. De individuella konsekvenserna av ev. ökade biverkningar för den vaccinerade behöver beaktas när två eller fler vaccin ges samtidigt. Det är särskilt viktigt vid vaccination av äldre, medicinskt sköra personer och vid vaccination av gravida.

Barn rekommenderas generellt alltid minst 7 dagars intervall mellan covid-vaccination och annan vaccination, behandlande läkare avgör om undantag är motiverat.

Vid tveksamheter om sjukdomskaraktär och lämpligheten att vaccinera ska patientansvarig eller annan sakkunnig läkare rådfrågas.

- Om covid-vaccin inte ges samma dag som ett annat vaccin skall man vänta minst 7 dagar innan man ger det andra vaccinet.
- Nuvaxovid ska inte ges vid samma tillfälle som det förstärkta influensavaccinet, det ska gå minst en vecka emellan.
- Varken det förstärkta influensavaccinet eller det adjuvanterade covid-19-vaccinet Nuvaxovid ska ges vid samma tillfälle som konjugerat pneumokockvaccin.

	Vaxigrip Tetra	Fluad Tetra	Fluenz Tetra	Pneumovax (PPV23)	Prevenar 13	Apexxnar (PCV20)	Comirnaty BA.4-5	Nuvaxovid	TBE	Hepatit	Bältros	HPV-vaccin		
Vaxigrip Tetra	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		
Fluad Tetra	Red	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green		
Fluenz Tetra	Red	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green		
Pneumovax (PPV23)	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green		
Prevenar 13	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green		
Apexxnar (PCV20)	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Red	Green	Green	Red	Green		
Comirnaty BA.4-5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Green	Green	Green	Green		
Nuvaxovid	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Green		
TBE	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Green	Green	Green		
Hepatit	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Green	Green		
Bältros	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Green		
HPV-vaccin	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red		

- Kombination av vaccin vid samma tillfälle: Grönt = OK, Rött = Nej
- Om 2 olika vacciner ges vid samma tillfälle skall dessa ges i olika extremiteter.