

## PPM - BHK vid PVK-hantering

| Förberedelse                                                  |    |     |             |
|---------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
|                                                               | Ja | Nej | Ej relevant |
| Kortärmad arbetsdräkt                                         |    |     |             |
| Inga ringar, armband eller armbandsur                         |    |     |             |
| Naglar korta och utan nagellack                               |    |     |             |
| Håret kort eller uppsatt                                      |    |     |             |
| Handdesinfektion utförd före patientkontakt                   |    |     |             |
| *Plastförkläde                                                |    |     |             |
| Ren och iordningställd arbetsyta                              |    |     |             |
| Handdesinfektion utförd före hantering/uppdukning av material |    |     |             |

| Genomförande                                                                     |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|                                                                                  | Ja | Nej |
| Huddesinfektion utförd enligt gällande riktlinjer, rätt medel och verkningstid** |    |     |
| Beröring av insticksställe efter desinfektion undviks                            |    |     |
| Korrekt handdesinfektion innan handskar                                          |    |     |
| Handdesinfektion efter handskar tagits av                                        |    |     |

\* Om det arbetsmomentet vid observationen inte kräver plastförkläde ifylles här **"Ej relevant"**. Om alternativet **"Ej relevant"** är ifyllt räknas detta som korrekt.

\*\*[Desinfektera hudområdet med klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70 % alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70 % isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Tvätta med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder på ett väl tilltaget område som motsvarar ytan för förbandet. Huden ska vara fuktig minst 30 sekunder innan den torkar. Låt huden lufttorka.](#) (Vårdhandboken)